



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области**

(Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14

E-mail: oren-rpn@esoo.ru

13.04.2024 №56-00-11/04-2419-2024

На № _____ от _____


О направлении памятки по

Главам администраций
городских округов, муниципальных
образований, сельских поселений
Оренбургской области
(по списку)

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Оренбургской области в послепаводковый период в 2024 г. направляет памятку для населения по проведению дезинфекции помещений, вышедших из зоны подтопления.

Приложение: памятка для населения на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



К.А. Ключева

Кочиев Павел Мевлудович
8 (3532) 331411



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
(подвергшимся подтоплению домовладений)
по применению дезинфицирующего средства
«ХЛОРАВИР» (таблетки)

Проведение дезинфекции помещений (обработка помещений поводится самостоятельно жильцами)

Объекты обеззараживания: поверхности помещений (пол, стены, двери); посуда; белье; игрушки.

Способы обеззараживания:

- поверхности помещений (пол, стены, мебель) протирают или орошают;
- посуда, белье, игрушки замачиваются в дезинфекционном растворе.

Рабочие растворы готовят по противовирусному режиму (таблица 1) в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения необходимого количества таблеток в водопроводной питьевой воде комнатной температуры. Емкости с рабочими растворами для дезинфекции должны иметь крышки и быть плотно закрыты.

Пример 1: для дезинфекции поверхностей в помещениях необходимо использовать 0,1% раствор «Хлоравира», для этого растворяют 6 таблеток препарата в 10 л. воды. Ветошь смачивают в приготовленном растворе и протирают поверхности. Оставляют на 1 час. По истечении времени обеззараживания (таблица 1) поверхности промывают чистой водой. Итого, как пример, на обработку одного дома площадью 100 кв. м (без площади территории) потребуется 10 л рабочего раствора, то есть 10 л воды и 6 таблеток препарата.

Таблица 1.

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, (%) | Кол-во таблеток (шт.) на 10 л воды | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,1 | 6 | 1 час | Протираание или орошение |
| Посуда | 0,1 | 6 | 2 часа | Погружение |
| Белье | 0,1 | 6 | 1 час | Замачивание |

Поверхности в помещениях, жесткую мебель, протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора– 100 мл на м.кв. обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 100 мл на м.кв. при использовании опрыскивателя. Для дезинфекции комплекта столовой посуды норма расхода – 2 л. на комплект.

После окончания дезинфекции в помещении следует провести влажную уборку, проветрить помещение не менее 30 минут, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протереть сухой ветошью.

Белье после дезинфекции стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора.

Посуду после дезинфекции промывают водой не менее 3 минут до исчезновения запаха хлора.

ВНИМАНИЕ

РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- 1. К работе не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим препаратам.**
- 2. Все работы с растворами средства необходимо проводить с защитой органов дыхания и кожи рук (резиновыми перчатками).**
- 3. Помещения проветривают не менее 30 минут до исчезновения запаха хлора.**
- 4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах), необходимо выйти из помещения, рот и носоглотку прополоскать водой, при необходимости обратиться к врачу.**

